

Kontrollopplegg schwannomatose

	Undersøkelse	Intervall	Alder ved oppstart	Styrke*
Schwannomatose	Klinisk undersøkelse og vurdering av smerte og nevrologisk undersøkelse	Årlig	12-14 år	Moderat
Schwannomas	MR av hjerne og ryggmarg	I henhold til spesifikke gen-/aldersanbefalinger	Diagnosetidspunkt eller 12-14 år	Sterk
	MR av hele kroppen	Baseline eller like etter. Vurder å veksle med kraniospinal-	Diagnosetidspunkt eller 12-14 år	Moderat
	Ultralyd	Vurderes for problemløsning i ekstremiteter eller interkostal-	Ved behov	Moderat

* Denne graderingen er basert på publiserte artikler og ekspertkonsensus: sterk – ekspertkonsensus OG konsistente bevis, moderat – ekspertkonsensus MED inkonsistente bevis OG/ELLER nye bevis som sannsynligvis støtter anbefalingen, svak – ekspert flertallsbeslutning UTEN konsistente bevis

Kontrollopplegg schwannomatose

Denne retningslinjen er basert på best tilgjengelig forskningsbasert dokumentasjon og konsensus fra eksperter på dette feltet, og oppdateres jevnlig for å gjenspeile endringer i dokumentasjonen.

Forventningen er at klinikere vil følge denne retningslinjen, med mindre det foreligger individuelle tungtveiende kliniske grunner for å la være.



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)



www.genturis.eu