Protocolo para el diagnóstico, las pruebas genéticas y la vigilancia en personas con síndrome de Birt-Hogg-Dubé

Esta guía para el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de las personas con síndrome de Birt-Hogg-Dubé se ha elaborado a partir de la mejor evidencia disponible y el consenso de expertos en esta área y se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en la evidencia.

La expectativa es que los médicos sigan estas pautas a menos que haya una razón clínica convincente para realizar un tratamiento diferente, específico para un paciente individual.

European
Reference
Network

for rare or low prevalence
complex diseases

Network
Genetic Tumour Risk
Syndromes (ERN GENTURIS)

www.genturis.eu

Protocolo para el diagnóstico, las pruebas genéticas y el seguimiento en personas con síndrome de Birt-Hogg-Dubé

El diagnóstico del síndrome BHD debe considerarse en				Fortaleza *	Recomendación
<ul style="list-style-type: none"> • Neumotórax espontáneo primario. • Quistes pulmonares múltiples. • Neoplasia renal bilateral o multifocal. • Carcinoma de células renales, en menores de 50 años o familiar. • Múltiples pápulas cutáneas compatibles con fibrofolliculomas/tricodiscomas. • Cualquier combinación de las manifestaciones mencionadas anteriormente en un individuo o en una familia. 				Fuerte	1a
				Fuerte	1b
				Fuerte	1c
				Fuerte	1d
				Fuerte	1e
				Fuerte	1f
Se deberían ofrecer pruebas genéticas para el síndrome de BHD					
<ul style="list-style-type: none"> • Neumotórax espontáneo primario, si es recurrente o familiar. • Quistes pulmonares múltiples sin causa conocida. • Neoplasia renal bilateral o multifocal. • Carcinoma de células renales de inicio temprano (generalmente definido como <45 años) o familiar. • Múltiples pápulas cutáneas compatibles con fibrofolliculomas/tricodiscomas y al menos una confirmada histológicamente. • Cualquier combinación de las manifestaciones mencionadas anteriormente en un individuo o en una familia, con o sin antecedentes familiares conocidos de síndrome de BHD. 				Fuerte	6a
				Fuerte	6b
				Fuerte	6c
				Fuerte	6d
				Fuerte	6e
				Fuerte	6f
Protocolo de seguimiento	Examen o prueba	Edad	Intervalo		
Carcinoma de células renales	Resonancia magnética renal	20 años y para toda la vida	Cada 1-2 años	Fuerte	11, 13, 13a, 13b, 14
Fibrofolliculomas / tricodiscomas	Consideración de la necesidad de una evaluación dermatológica	En el momento del diagnóstico	Cuando sea necesario	Fuerte	18

* Esta calificación se basa en artículos publicados y consenso de expertos: fuerte: consenso de expertos Y evidencia consistente, moderada: consenso de expertos CON evidencia inconsistente Y/O nueva evidencia que probablemente respalde la recomendación, débil: decisión de la mayoría de expertos SIN evidencia consistente.